

CAVERJECT® (alprostadil)

PERGUNTA: Você sabe como utilizar o medicamento Caverject®?

RESPOSTA:

Informações importantes para o uso de Caverject®

- ⊕ Caverject® (alprostadil) é utilizado no tratamento da disfunção erétil.¹
- 👤 Antes de utilizá-lo, você deve ser treinado pelo seu médico quanto à técnica adequada de autoaplicação. Seu médico também determinará a dose adequada para o seu caso.¹
- 📄 As informações aqui contidas destinam-se exclusivamente à autoaplicação de Caverject®. Não utilize os métodos aqui descritos para a administração de qualquer outro medicamento.¹

Existem etapas e cuidados importantes para manusear o produto. Veja como utilizar o medicamento.

1. Como preparar o medicamento?

Passo 1: Lave as mãos com água e sabão e seque-as com uma toalha limpa.¹


Passo 2: Manuseie a seringa apenas no seu corpo central. Não toque na agulha com as mãos e não a encoste em nenhuma superfície.¹

Passo 3:

Seringa Luer lock e selo de segurança.



Gire cuidadosamente a parte superior do selo de segurança cinza da seringa, de forma a romper o lacre e, desta forma, destacar a metade superior do lacre.¹



Uma vez destacada a parte superior do lacre, encaixe cuidadosamente a agulha na seringa com um movimento giratório, sem retirar o protetor da agulha. **UTILIZE A AGULHA MAIS LONGA (22G1½ - 0,7 x 40).**¹




Essa agulha mais longa deve ser usada **APENAS** para a transferência do diluente para o frasco ampola.¹

Passo 4: Retire a capa plástica da tampa do frasco-ampola.¹

Passo 5: Limpe a tampa de borracha do frasco-ampola de Caverject® utilizando uma compressa com álcool. Descarte essa compressa.¹




Passo 6: Retire cuidadosamente o protetor da agulha da seringa.¹



Não toque na agulha exposta. Segure a seringa com a ponta da agulha para cima e empurre o êmbolo até a marca de 1-cc (1 mL) na seringa. Isso expulsará o ar e o excesso de diluente.¹


Passo 7: Introduza a agulha na parte central da tampa de borracha do frasco-ampola e, então, empurre o êmbolo para injetar o diluente no frasco. Passe imediatamente para o procedimento seguinte (nº 8).¹



Passo 8: Cuidadosamente e, sem retirar a agulha, segure em conjunto a seringa e o frasco-ampola, girando-o delicadamente (não agitar), para que a medicação se dissolva completamente. Suavemente gire o frasco-ampola para dissolver qualquer eventual resíduo de medicamento no pescoço do frasco-ampola. Não utilize a solução se ela mudar de cor, ficar turva ou se contiver partículas suspensas.¹

Passo 9: Mantendo a seringa no frasco-ampola, segure firmemente esse conjunto em uma das mãos.¹

Passo 10: Para retirar a medicação, inverta a posição do frasco-ampola com a seringa posicionada, de tal forma que o frasco-ampola esteja na posição superior e a seringa na posição inferior (veja a figura).¹



(1)

Assegurando-se de que a ponta da agulha esteja imersa abaixo do nível do líquido, lentamente puxe o êmbolo até que toda a solução seja retirada do frasco-ampola.¹

Passo 11: Se houver bolhas de ar na seringa, bata levemente na seringa até que as bolhas flutuem sobre a solução.¹



(1)


Segurando a seringa posicionada para cima, empurre o êmbolo até a marca do volume prescrito por seu médico.¹

Com isto, serão expelidos, de volta para o frasco-ampola, o ar e o excesso de solução.¹

Passo 12: Segure a seringa (não pelo êmbolo) e remova o conjunto seringa/agulha do frasco-ampola de Caverject®.¹

Passo 13: Cuidadosamente, recoloca o protetor na agulha.¹

Passo 14: Substitua essa agulha de transferência pela agulha mais curta (27G½ - 0,4 x 13). Mantendo a agulha ainda protegida com sua capa plástica, coloque a seringa sobre uma superfície.¹



Essa agulha mais curta e mais fina deve ser usada **APENAS** para a aplicação do medicamento.

2. Onde devo aplicar o medicamento?

Caverject® deve ser injetado em uma das duas áreas do pênis denominadas corpos cavernosos. Os corpos cavernosos estão localizados em cada um dos lados laterais do pênis, no sentido do comprimento (veja a imagem). Siga as instruções seguintes cuidadosamente, para ter certeza de que a medicação foi injetada corretamente.¹

Vista superior do pênis indicando os locais próprios para injeção.



Escolha um dos lados do pênis, como mostrado na figura. **EVITE VASOS SANGUÍNEOS VISÍVEIS.**¹



Cada vez que você utilizar o Caverject®, alterne o lado do pênis e varie o local de cada aplicação.¹

3. Como aplicar o medicamento?

Passo 1: Faça a autoaplicação mantendo-se sentado ou levemente reclinado.¹

Passo 2: Segure a cabeça de seu pênis entre seu polegar e dedo indicador. Estire o pênis e segure-o firmemente contra sua coxa, de maneira que você possa visualizar claramente o ponto selecionado para a aplicação. Em homens


não circuncidados, a pele deve ser retraída para assegurar uma localização adequada da aplicação.¹

Passo 3: Limpe toda a área de injeção utilizando outra compressa com álcool. Não descarte esta compressa, pois ela será novamente utilizada mais adiante (veja Passo 7).¹

Passo 4: Reposicione o pênis firmemente contra sua coxa como orientado no Passo 2, para que ele não se mova durante a aplicação.¹

Passo 5. Segure a seringa entre o polegar e o dedo indicador (veja a figura). Com um movimento contínuo, constante, introduza a agulha num ângulo de 90 graus no local da aplicação, como determinado pelo seu médico, até que a porção metálica da agulha esteja quase que totalmente no pênis.¹

Corte Transversal do pênis, indicando o local e o ângulo da injeção.



(1)

Passo 6: Segurando a seringa entre dois dedos, mova seu polegar ou indicador até o topo do êmbolo e pressione para baixo, injetando o conteúdo total da seringa através de um movimento lento e constante (veja figura).

Injetando o conteúdo da seringa.¹



(1)

Passo 7: Ainda segurando a seringa, retire a agulha de seu pênis. Pressione suavemente o local da aplicação com a compressa, por cerca de 5 minutos, ou até que cesse o sangramento.¹

Saiba Mais

O que posso fazer com esta informação?

Este documento fornece uma resposta à sua pergunta sobre um produto da Pfizer, mas não contém todas as informações disponíveis sobre este medicamento. Os pacientes não devem usar estas informações para diagnosticar um problema de saúde, ou doença. Estes dados são fornecidos apenas para fins informativos e não pretendem substituir a necessidade de sempre consultar seu médico e/ou farmacêutico. Você deve falar sempre com o seu médico e/ou farmacêutico para saber se este medicamento é o apropriado para seu tratamento. Esses profissionais de saúde são os mais indicados para fornecer informações sobre se o tratamento e a medicação são os mais adequados, pois eles têm acesso não só ao seu histórico clínico como também à informação sobre todos os medicamentos.

Onde posso conseguir mais informações?

Para obter informações adicionais a respeito do medicamento Caverject® (alprostadil) orientamos que verifique a bula aprovada para o produto, disponível no site <https://www.pfizer.com.br/bulas> ou então, entre em contato conosco através do telefone 0800 770 15 75, e-mail falepfizer@pfizer.com

Referências:

1. Caverject® - Bula Paciente - LL-PLD_Bra_ CDSv5.0_03Dec2021_v1_CAVPOI_15_VP 17/Dez/2021