

Prevenar® (vacina pneumocócica 13-valente (conjugada))

PERGUNTA: Meu filho tem mais de 6 meses de idade e o médico recomendou a vacina Prevenar 13® - ele ainda pode receber esta vacina?

Resposta:

A vacinação de rotina com a vacina Prevenar 13® em bebês tem a recomendação de começar aos 2 meses de idade. Quando, por qualquer motivo, esta vacinação atrasar e a criança estiver com idade superior a 6 meses, é possível, seguindo a recomendação médica, receber a vacina Prevenar 13® com número de doses e tempo de intervalo diferentes dependendo da idade da criança que vai receber a primeira dose.¹

A tabela 1 abaixo mostra o número de doses e intervalos recomendados pela Pfizer para vacinação de crianças acima de 6 meses com Prevenar 13®.

Tabela 1. Vacinação com a vacina Prevenar 13® em crianças acima de 6 meses de idade¹

Idade na primeira dose	Série Primária*	Dose de Reforço
7 – 11 meses	2 doses *	1 dose entre 12 e 15 meses de idade
12 – 23 meses	2 doses **	-
24 meses a 17 anos que já tenham recebido ou não uma ou mais doses da vacina pneumocócica 7 valente conjugada***	1 dose***	-

* Intervalo mínimo entre doses é de 4 semanas.

** Intervalo mínimo entre doses é de 8 semanas.

***Crianças já vacinadas com a vacina pneumocócica 7-valente conjugada, aguardar 8 semanas entre a dose recebida da vacina pneumocócica 7-valente conjugada e a dose da vacina Prevenar-13®.

Veja abaixo em “Saiba Mais” o significado de “série primária” e “dose de reforço”.

A Pfizer não pode recomendar tratamentos aos pacientes. Converse com seu médico caso ainda haja dúvidas sobre a vacinação com Prevenar 13® em crianças acima de 6 meses.

Saiba Mais:

Você sabe o que é esquema primário/série primária de vacinação?

Esquema primário/série primária de vacinação é o primeiro contato do organismo com o agente contido na vacina; dependendo da idade, da condição de saúde do paciente e da vacina a ser aplicada, o esquema pode conter somente uma ou mais de uma dose necessária para estimular o organismo a produzir anticorpos para a proteção contra uma determinada doença.

Você sabe o que é dose de reforço?

Dose de reforço é uma dose adicional da vacina e que é aplicada após o esquema primário, com o objetivo de elevar a quantidade de anticorpos produzidos pelo organismo, mantendo assim a proteção para determinada doença. É natural que a quantidade de anticorpos que o organismo produz após uma vacinação diminua com o tempo, por isso as doses de reforço são necessárias, dependendo da idade.

Por que estou recebendo esta informação?

Este documento fornece uma resposta à sua pergunta sobre um produto da Pfizer, mas não contém todas as informações disponíveis sobre este medicamento. Os pacientes não devem usar estas informações para diagnosticar um problema de saúde, ou doença. Estes dados são fornecidos apenas para fins informativos e não pretendem substituir a necessidade de sempre consultar seu médico e/ou farmacêutico. Deve falar sempre com o seu médico e/ou farmacêutico para saber se este medicamento é o apropriado para seu tratamento. Esses profissionais de saúde são os mais indicados para fornecer informações sobre se o tratamento e a medicação são os mais adequados, pois, eles têm acesso, não só ao seu histórico clínico, como também à informação sobre todos os medicamentos.

Onde posso conseguir mais informações?

Para obter informações adicionais a respeito do medicamento Prevenar 13® (vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)) orientamos que verifique a bula aprovada para o produto, disponível no site <https://www.pfizer.com.br/bulas> ou então, entre em contato conosco através do telefone 0800 770 15 75, e-mail falepfizer@pfizer.com.

Referências:

1. Prevenar 13 (vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)). Bula Paciente. Versão: LL-PLD_Bra_CDSv25.0_01Jul2019_v5_PRV13_54_VP 20/Out/2022.